

K.B. 17.6.2022 B.S. 15.7.2022
In werking 1.9.2022

- **Wijzigen**
- **Invoegen**
- **Verwijderen**

Artikel 34 – INTERVENTIONELE VERSTREKKINGEN

§ 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van de in § 2 bedoelde geneesheer vereist is:

b) Andere percutane behandelingen

...

~~De verstrekking 589676 – 589680 kan slechts aangerekend worden naar aanleiding van één van de onderstaande indicaties:~~

~~A. Osteoporotische indeukingsfracturen "single-level » of "multi-level » en lager dan T5 zonder neurologische compressie en zonder uitvalsverschijnselen waarbij aan al de volgende voorwaarden voldaan wordt:~~

~~a) blijvende pijnklachten van meer dan 8 weken en te wijten aan de fractuur en waarbij de medicamenteuze pijntherapie – die gedurende minimaal 8 weken uitgeprobeerd werd – ofwel faalde ofwel aanleiding gaf tot te hinderlijke nevenwerkingen; dit wordt beschreven in een verslag van de arts die de pijntherapie toepaste; de interventie moet wel plaatsgrijpen binnen een periode van 4 maand nadat de eerste objectieve vaststellingen van de indeukingsfractuur werden gedaan tenzij een progressie van de fractuur aangetoond kan worden;~~

~~b) het hoogteverlies ligt tussen de 20 en de 60 %;~~

~~c) de dorsale muur is behouden;~~

~~d) er is botoedeem aanwezig;~~

~~e) de fracturen zijn volgens de AO classificatie type A1.1, A1.2, A1.3 of A2.3;~~

~~f) bij een man:~~

~~– ofwel een T score, berekend ten opzichte van een mannelijke referentiepopulatie van $\leq -2,5$ ter hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) bij een onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie;~~

~~– ofwel een T score, berekend ten opzichte van een mannelijke referentiepopulatie van ≤ -1 ter hoogte van de heup (volledige zone of zone van de hals) bij een onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie.~~

~~g) bij een vrouw met een door glucocorticoïden geïnduceerde osteoporose die behandeld wordt met een langdurige (meer dan 3 maanden) orale dagelijkse dosis van minstens 7,5 mg prednison of equivalent die wordt toegediend in het kader van een wetenschappelijk erkende indicatie:~~

~~– ofwel moet de patiënte zich in de menopauze bevinden zonder hormonale substitutie;~~

~~- ofwel moet de patiënte een T-score vertonen, berekend ten opzichte van een vrouwelijke referentiepopulatie, van $\leq -1,5$ gemeten ter hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) of van de heup (volledige zone of zone van de hals) bij een onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie.~~

~~h) bij een vrouw in de menopauze : een T-score, berekend ten opzichte van een vrouwelijke referentiepopulatie van $\leq -2,5$ ter hoogte van de lumbale wervelkolom (L1-L4 of L2-L4) of van de heup (volledige zone of zone van de hals) bij een onderzoek uitgevoerd met radiologische absorptiometrie met dubbele energie.~~

~~B. Indekingsfracturen veroorzaakt door het multiple myeloma van Kahler, zonder neurologische compressie en zonder uitvalsverschijnselen, waarbij aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:~~

~~a) blijvende pijnklachten van meer dan 6 weken en te wijten aan de fractuur en waarbij de medicamenteuze pijntherapie die gedurende minimaal 6 weken uitgeprobeerd werd ofwel faalde ofwel aanleiding gaf tot te hinderlijke nevenwerkingen; dit wordt beschreven in een verslag van de arts die de pijntherapie toepaste;~~

~~b) de dorsale muur is behouden;~~

~~c) er is botoedeem aanwezig;~~

~~d) de fracturen zijn volgens de AO classificatie type A1.1, A1.2, A1.3 of A2.3;~~

~~In beide gevallen, A + B, wordt de diagnose gesteld op basis van de volgende onderzoeken :~~

~~- en RX face en profiel~~

~~- en MRI of indien een contra-indicatie hiervoor een Ct-scan~~

~~- en botscentigrafie zonder SPECT~~

~~En bij osteoporotische indeukingsfracturen ook een DEXA-scan.~~

~~De documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de hogervermelde indicaties, moeten steeds in het dossier aanwezig zijn en moeten naar de adviserend geneesheer verstuurd worden als hij / zij dit vraagt.~~

~~De verstrekking 589676 - 589680 wordt voor elke behandelde wervel aan 100 % aangerekend, met dien verstande dat er niet meer dan 2 wervels in één tijd mogen worden aangerekend aan de ziekte en invaliditeitsverzekering.~~

~~Per periode van twee kalenderjaren kunnen ten hoogste twee verstrekkingen 589676 - 589680 uitgevoerd tijdens één enkele operatiezitting worden aangerekend aan de verplichte verzekering gezondheidszorgen.~~

~~Uitzondering op deze toepassingsregel vormen de bijkomende verstrekkingen 589676 - 589680, uitgevoerd tijdens een tweede of volgende operatiezitting, in zoverre er voorafgaand aan de uitvoering ervan goedkeuring wordt bekomen vanwege het College Geneesheren Directeurs.~~

~~De verstrekking 589676 - 589680 mag niet aangerekend worden voor een vertebroplastie."~~

De verstrekkingen 589676-589680 en 589890-589901 kunnen slechts aangerekend worden naar aanleiding van één van de onderstaande indicaties:

A. Osteoporotische indeukingsfracturen "single level" of "multilevel" zonder neurologische compressie en zonder uitvalsverschijnselen waarbij aan alle volgende voorwaarden voldaan wordt:

a) blijvende pijnklachten van meer dan 35 dagen en te wijten aan de fractuur en waarbij de medicamenteuze pijntherapie - die gedurende minimaal 35 dagen uitgeprobeerd werd - ofwel faalde ofwel aanleiding gaf tot te hinderlijke nevenwerkingen; dit wordt beschreven in een verslag van de arts die de pijntherapie toepaste; de interventie moet wel plaatsgrijpen voor de indeukingsfractuur geconsolideerd is, binnen een periode van 120 dagen;

b) er is botoedeem aanwezig, gedocumenteerd door medische beeldvorming;

c) met een T-score, berekend ten opzichte van een referentiepopulatie, van ≤ -1 ;

d) na een klinische investigatie en documentatie van gekende risicofactoren en opname in een opvolgtraject met aangepaste therapie voor osteoporose en fractuurpreventie.

De indicatiestelling gebeurt tijdens een multidisciplinair spine consult (MSC) binnen een multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie en de data worden geregistreerd in het desbetreffende register. De exacte modaliteiten van het MSC en het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie worden beschreven in de artikelen 2 en 14, n).

B. Indeukingsfracturen veroorzaakt door de aanwezigheid van een osteolytische maligne tumor, zonder neurologische compressie en zonder uitvalsverschijnselen, waarbij aan alle volgende voorwaarden voldaan wordt:

a) er is botoedeem aanwezig, gedocumenteerd door medische beeldvorming;

b) na bespreking van de indicatie in een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) tenzij in klinisch urgente omstandigheden. De data worden geregistreerd in het desbetreffende register.

In beide gevallen, A + B, wordt de diagnose gesteld op basis van de volgende onderzoeken:

- en RX face en profiel

- en NMR of indien een contra-indicatie hiervoor een botsintigrafie met SPECT.

En bij osteoporotische indeukingsfracturen ook een DEXA-scan.

De documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de hogervermelde indicaties, moeten steeds in het dossier aanwezig zijn en moeten naar de adviserend arts verstuurd worden als hij/zij dit vraagt.

De verstrekkingen 589676-589680 en 589890-589901 worden voor elke behandelde wervel aan 100 % aangerekend, met dien verstande dat er niet meer dan twee wervels in één tijd mogen worden aangerekend aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De verstrekkingen 589676-589680 en 589890-589901 kunnen niet onderling gecumuleerd worden.

De verstrekkingen 589676-589680 en 589890-589901 mogen verricht worden door artsen-specialisten voor röntgendiagnose en door artsen-specialisten voor neurochirurgie en artsen-specialisten voor orthopedische heilkunde. "

"§ 2. De verstrekkingen opgenomen in dit artikel mogen verricht worden door ~~geneesheren~~artsen-specialisten voor röntgendiagnose, en door andere ~~geneesheren~~artsen-specialisten, voor zover de behandelde pathologie tot hun specialisme behoort, tenzij anders vermeld bij de verstrekking zelf.